



Стенлей. Плодовете узряват през последното десетдневие на август. Те са едри, с обратнойцевидна форма. Кожицата е виолетовосиня с обилен восьъчен налеп. Плодовото месо е зеленикаво, средно сочно, плътно, с добри вкусови качества. Костилката е едра, полуотделяща се от месото. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка. Те са транспортабилни и понасят кратковременно съхранение.



Чачанска лепотица. Плодовете узряват в края на юли и началото на август. Те са едри, овални, симетрични. Кожицата е виолетовосиня, с обилен восьъчен налеп. Плодовото месо е зеленикавожълто, сочно, кисело-сладко. Костилката е средно едра, отделяща. Плодовете имат универсално предназначение. Транспортабилността е добра и понасят кратковременно съхраняване.



Рут Герщетер. Дървото е умерено растящо. Короната е прибрана. Цъфтежът е средно ран. Сортът е частично самоплоден. Опрашва се от Алтанова ренклода, Стенлей, Габровска, Стринава. В плододаване встъпва рано. Има добра родовитост и средна устойчивост на ниски температури и повратни студове. Плодовете узряват през втората десетдневка на юни. Те са средно едри до едри, широкоовални, несиметрични. Кожицата е тъмно синя с виолетов оттенък и плътен восьъчен налеп. Плодовото месо е жълто-кафеникаво, плътно, сочно, със сладко-кисел вкус, с аромат. Костилката е средно едра, отделяща се. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние. Транспортабилността им е добра.



Тулеу Тимпуриу. Дървото е с умерен растеж. Короната е рядка, метловидна. Цъфтежът е средно ран. Сортът е мъжкостерилен. Опрашва се от Зелена ренклода, Алтанова ренклода, Стенлей и Ана Шпет. В плододаване встъпва рано с обилна и редовна родовитост. Устойчив е на червени петна. Не е взискателен към почвените условия. Притежава добра устойчивост на късни пролетни мразове. Плодовете узряват 10-15 юли. Те са много едри, яйцевидни, асиметрични. Кожицата е тънка виолетово-синя, с восьъчен налеп. Месото е зеленикаво-жълто, сочно, с отличен вкус. Костилката е средно едра, отделяща. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и преработени. Имат добра транспортабилност.